

### Cas de tétanos néonatal TNN

- ★ Tout nouveau-né normalement **capable de téter** ou **crier** et qui **perd cette capacité** et/ou développe une raideur généralisée avec des **contractions** au cours des **28 jours** suivants la naissance.

### Comment améliorer la détection des cas de TNN ?

1. Chaque semaine effectuer une recherche active des cas de TNN
  - dans votre centre de santé
  - dans les hôpitaux publics et privés
  - chez les tradithérapeutes
  - dans la communauté
2. Sensibiliser les communautés, les cliniciens et les tradithérapeutes pour la détection rapide des cas de TNN.



### Que faire dès qu'on a un cas de TNN ?

- Notifier le cas par RAC, téléphone ou tout autre moyen de communication
- Mener une investigation en remplissant le formulaire d'enquête de TNN et transmettre le formulaire au District,
- Organiser une riposte après sensibilisation de la communauté



### Comment organiser une riposte contre le TNN ?

- Vacciner systématiquement, autour du cas, toutes les femmes en âge de procréer de l'aire de santé en un tour si la couverture de riposte atteint plus de 80% de la cible. Un 2ème tour est nécessaire si la couverture n'atteint pas 80 %
- Poursuivre le renforcement du PEV de routine
- Renforcer la communication
- Produire un rapport de vaccination à transmettre à la DNS

### Quels sont les principaux indicateurs de performance de la surveillance des cas de TNN

- ☞ Pourcentage de district ayant investigué au moins un cas de TNN dans l'année. **Cible  $\geq 80\%$**
- ☞ Pourcentage de district ayant organisé une riposte autour d'un cas de TNN. **Cible  $\geq 80\%$ .**